

Informatie over:

Borstvoeding na narcose of sedatie

Wanneer u wakker wordt na narcose of sedatie, is het grootste deel van de medicijnen afgebroken door uw nieren en uw lever. De medicijnen die u voor de narcose of sedatie heeft gekregen zitten dan niet meer in uw lichaam.

Uit onderzoek is gebleken dat er maar een heel kleine hoeveelheid medicijnen in de moedermelk terechtkomt. Het is daarom meestal niet nodig om de moedermelk af te kolven. Alleen als u stuwings of andere ongemakken heeft, is het afkolven van de moedermelk soms nodig. Het is aan te raden om kort voor de ingreep nog te kolven of borstvoeding te geven om eventuele stuwings te voorkomen.

Als u borstvoeding geeft, meld dit dan vóór uw onderzoek of behandeling. De anesthesioloog of medewerker van de afdeling Anesthesiologie houdt daar dan rekening mee voor de narcose of sedatie.

Zodra u na de ingreep wakker genoeg bent om uw baby goed vast te houden, kunt u uw baby weer veilig borstvoeding geven.

Pijnstillers die u veilig kunt gebruiken:

- Paracetamol
- Ibuprofen
- Diclofenac

Pijnstillers die u alleen kunt gebruiken in overleg met uw arts:

- Naproxen (door de lange werking)
- Morfinepreparaten zoals tramadol

Pijnstillers die u beter niet kunt gebruiken:

- Codeïne
- Oxycodon, oxycontin en oxynorm

Na een grote operatie

Na een grote operatie volgen vaak voor een langere periode zwaardere medicijnen. Het kan nodig zijn om het geven van borstvoeding enkele keren over te slaan. Dit kunt u overleggen met de anesthesioloog. Als overslaan niet nodig is, dan mag u weer voeden zodra u goed aanspreekbaar bent. Het is wel belangrijk om over voldoende afgekolfde moedermelk te beschikken. Wij raden u aan uw eigen kolf mee te nemen naar het ziekenhuis.