

Heeft u herkenbare klachten van uw hartritmestoornis? Dan kunt u, naast uw standaardmedicatie, eenmalig de volgende medicatie innemen:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- Als u **geen** van de volgende **bloedverdunners** gebruikt – edoxaban (Lixiana), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa), acenocoumarol (Sintromitis) of fenprocoumon (Marcoumar) – neem dan uiterlijk 24 uur na het ontstaan van de klachten contact op voor overleg met de **Atriumfibrilleren-polikliniek** tussen 08.30 uur en 09.00 uur. U wordt dan verzocht 's ochtends nuchter te blijven. U mag wel uw medicatie innemen met water. Roken is niet toegestaan.
- Gebruikt u **wel** een van bovengenoemde **bloedverdunners** en blijven de klachten bestaan ondanks geadviseerde extra medicatie? Neem dan na 48 uur contact op met de **Atriumfibrillerenpolikliniek** tussen 8.30 uur en 09.00 uur. U wordt dan verzocht 's ochtends nuchter te blijven. U mag wel uw medicatie innemen met water. Roken is niet toegestaan.
- Wanneer uw klachten dusdanig heftig zijn dat u niet kunt afwachten, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Cardiologie. Buiten kantooruren neemt u contact op met de huisarts(enpost).

### Telefoonnummers

Atriumfibrillerenpolikliniek: 020 – 755 6038 (ma t/m vrij 08.30-09.00 uur)

Polikliniek Cardiologie: 020 – 755 7005 (ma t/m vrij 8.00-16.30 uur)

Huisartsenpost Amstelland: 020 – 456 2000