

Richtlijnen na operatieve ingreep (kind)

De eerste dag(en) na de behandeling

Uw kind heeft een ingreep ondergaan. Door de narcose is het verstandig uw kind rustig aan te laten doen de eerste 24 uur na de operatie. Overleg met de behandelend specialist wanneer uw kind weer mag douchen en in bad kan.

Pijn

Het is belangrijk dat u de voorgeschreven pijnstilling aan uw kind geeft. De pijnstilling zorgt er voor dat uw kind zich prettig voelt en het bevordert het genezingsproces.



Geef beslist geen Aspirine of Chefarine. Na de eerste drie dagen kunt u Paracetamol geven op geleide van pijn, echter nooit meer dan voorgeschreven.

Herstelperiode

Uw kind heeft tijd nodig om te herstellen. U kunt zelf het beste beoordelen hoe snel het herstelt en wat het wel en niet kan. Wanneer uw kind zich goed voelt kan het weer naar buiten. Overleg met de behandelend specialist wanneer uw kind weer naar school/crèche mag. Het is verstandig om het de eerste veertien dagen niet mee te laten doen met gymnastiek of activiteiten zoals fietsen, skaten, etc. Ook is het niet verstandig om uw kind te laten blazen (ballon of blaasinstrument). Dit om druk op de buikwand te voorkomen.

Complicaties

Enige verhoging bij uw kind is normaal. Maar als uw kind niet drinkt en koorts krijgt van meer dan 38,5 °C moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Als er thuis andere problemen optreden, kunt u altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Controle

Overleg met uw specialist over een eventuele controle afspraak.

Vragen en problemen

De Kinderdagverpleging is overdag bereikbaar via telefoonnummer: 020 - 755 7116. De Kinderafdeling is overdag bereikbaar via telefoonnummer: 020 - 755 7103.

's Avonds en 's nachts kunt u het ziekenhuis bereiken via 020 - 755 7000. Vraag dan naar de dienstdoende hoofdverpleegkundige.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl.