

Gebroken of gekneusde teen

Inleiding

U heeft een breuk en/of kneuzing van een van uw tenen. Dit heeft de arts door lichamelijk onderzoek vastgesteld. Het is meestal niet nodig om een röntgenfoto te laten maken.

Behandeling op de Spoedeisende hulp

Voor de behandeling van een gebroken teen is meestal geen operatie nodig. Met een speciale pleister, een zogenaamde dakpanpleister, spalken we uw teen. We plakken de gebroken teen vast aan de teen ernaast zodat deze niet meer kan bewegen. Zo heeft u minder pijn en geneest de breuk het snelst.

Leefregels

Voor een goede genezing zijn de volgende instructies belangrijk:

- Laat de dakpanpleister 1 tot 2 weken zitten. Zo nodig mag u de pleister en het gaasje (dat tussen de tenen zit) vervangen, bijvoorbeeld om hygiënische redenen.
- De pleister mag niet nat worden.
- Draag stevige schoenen tijdens het lopen.
- Plaats uw been bij rust hoog, dit vermindert de pijn.

Pijn

Bij pijnklachten kunt u paracetamol innemen; maximaal 3x per dag 1000 mg paracetamol om de 8 uur.

Herstel

De pijnklachten zijn meestal na 2 weken verminderd. Het duurt ongeveer 6 tot 8 weken voordat u helemaal geen klachten meer heeft. Omdat de breuk snel geneest, is het niet nodig om voor controle op de polikliniek te komen. Bij aanhoudende klachten kunt u terecht bij uw huisarts.

Vragen?

Als u na thuiskomst nog vragen heeft of onverwachte klachten krijgt, dan kunt u tussen 08.00 en 22.00 uur bellen met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 020 - 755 6560.

Buiten deze tijd belt u met het algemene nummer van Ziekenhuis Amstelland: 020 - 755 7000. Men verbindt u dan door met het dienstdoende avond- of nachthoofd. U kunt dan de vragen of klachten bespreken.

Met vragen kunt u ook terecht bij uw huisarts.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl