

## Recurrente vestibulopathie

### Inleiding

In deze folder vindt u meer informatie over de oorzaak, diagnose en behandeling van recurrente vestibulopathie.

### Klachten en symptomen

Recurrente vestibulopathie kenmerkt zich door plotselinge aanvallen van draaiduizeligheid. Deze aanvallen gaan vaak gepaard met misselijkheid en braken en nemen veelal enkele uren in beslag. De aanvallen kunnen echter variëren qua duur en intensiteit. Er is geen sprake van gehoorverlies of oorsuizen, dit in tegenstelling tot de ziekte van Ménière, een andere en wat meer bekende aandoening van het evenwichtssysteem.

### Onderzoek

Om een goede diagnose te stellen is onderzoek nodig. Het onderzoek bestaat uit:

- Gehoortest (audiogram).
- Evenwichtsonderzoek (ENG).
- Evt. bloedonderzoek.
- Evt. CT- of MRI-scan van slakkenhuis en gehoorzenuw.

### Oorzaak

Recurrente vestibulopathie is een aandoening aan het evenwichtsapparaat. Tot op heden is de oorzaak echter niet bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat een virusinfectie een rol speelt.

### Behandeling

Tijdens een aanval kan het nodig zijn medicijnen tegen de misselijkheid en

het braken te gebruiken. Tussen de aanvallen zijn meestal geen medicijnen nodig.

### Verloop

Vaak verdwijnen de klachten spontaan. Slechts bij een klein aantal patiënten blijft de klachten aanhouden en kunnen uiteindelijk ook gehoorsymptomen optreden.

### Vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek KNO, 020 - 755 7029.

### Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl