

Instructie toediening antistolling

Inleiding

De arts of verpleegkundige heeft verteld dat u tijdens of rondom uw operatie een verhoogde kans op trombose heeft. Bij trombose vormen zich bloedstolseltjes in de bloedvaten die kunnen leiden tot complicaties. Om dit te voorkomen krijgt u medicatie toegediend in de vorm van injecties. Deze antistolling injecties moeten gedurende een bepaalde periode, volgens voorschrift van de arts, toegediend worden. In deze folder krijgt u meer informatie over de injecties.

Wanneer een behandeling met antistolling?

Er kunnen twee situaties zijn, waarin u deze injecties krijgt voorgeschreven.

1. U heeft kort geleden een (orthopedische) operatie ondergaan, bijvoorbeeld een totale heup- of knieprothese. Deze operaties brengen een verhoogd risico op trombose met zich mee.
2. U moet een operatie ondergaan. Op de Polikliniek Anesthesie is aan u uitgelegd dat u voor de operatie uw bloedverdunner acenocoumarol (Sintrom) of fenprocoumon (Marcoumar) tijdelijk moet stoppen. Tijdens deze stop-periode is antistolling vereist om trombose te voorkomen.

Instructie voor thuis

U moet deze injecties thuis zelf doen of laten doen. De injecties moeten gedurende een bepaalde periode, volgens voorschrift van de arts, toegediend worden.

U dient de injectie éénmaal daags toe op een vast tijdstip. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit tijdig met u besproken. Wanneer u de aanwijzingen op de achterzijde van dit blad volgt, injecteert u zichzelf veilig en goed.

Op de website van Ziekenhuis Amstelland vindt u ook een filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de injectie moet worden gedaan. Bent u geopereerd in Ziekenhuis Amstelland, dan krijgt u ook in het ziekenhuis van de verpleegkundige instructies in het zelf toedienen van de injecties.

Recept en apotheek

Bent u geopereerd in Ziekenhuis Amstelland, dan stuurt de arts-assistent op de dag van ontslag het recept naar uw apotheek. U kunt de injecties daar af (laten) halen. Moet u in de stop-periode van de bloedverdunner injecties gebruiken, dan krijgt u van de anesthesist een recept en een toedieningsschema. U gaat met dit recept naar de apotheek.

Injectiespuiten en dosering

De injecties die u gebruikt zijn kant-en-klaar. De spuiten zijn gevuld met de juiste dosering en bedoeld voor éénmalig gebruik. U krijgt van de apotheek precies het aantal spuiten dat u nodig heeft. Wanneer u deze volgens de aanwijzingen heeft gebruikt, stopt u met het gebruik, tenzij de behandelend specialist anders heeft voorgeschreven.

U ontvangt van de apotheek een naaldenbeker waar u de gebruikte spuiten in weggooit. Wanneer u klaar bent met de antistollingsbehandeling, sluit u deze beker goed af met de bijgeleverde deksel en levert u deze in bij de apotheek. Bewaar de injectiespuiten en de beker met gebruikte spuiten altijd buiten bereik van kinderen.

Stappenplan toedienen antistollingsinjectie

Stap 1

Zet de spuit en naaldenbeker klaar. Controleer de spuit op juiste dosering en houdbaarheid.

Stap 2

Maak de injectieplaats bloot. De beste plaats is de buikplooi en het dijbeen.

Stap 3


Maak de antistollingsspuit open en verwijder het beschermdopje van de naald.

Stap 4

Pak met de ene hand een ruime huidplooi losjes vast.

Stap 5

Breng de injectienaald loodrecht in de huidplooi in.



Stap 6

Druk de zuiger langzaam verder totdat u niet verder meer kunt.

Stap 7

Verwijder de injectienaald uit de huid en doe de gebruikte spuit in de naaldenbeker.

Stap 8

Controleer de injectieplaats op eventueel nabloeden. Het kan gebeuren dat een klein druppeltje injectievloeistof via de insteekplaats ontsnapt. U hoeft de injectieplaats niet af te plakken met een pleister.

Waar moet u op letten bij het toedienen van antistolling?

- Wissel de injectieplaats af. Hiervoor kunt u uw eigen systeem hebben; bijvoorbeeld met de klok mee in de buikplooi injecteren. Hierdoor verkleint u de kans op weefselbeschadiging en wordt de vloeistof goed opgenomen.
- Wanneer zich een kleine blauwe plek op de injectieplaats vormt hoeft u zich geen zorgen te maken, waarschijnlijk heeft de naald een bloedvatje geraakt.
- Zorg dat uw handen en omgeving schoon zijn wanneer u uzelf injecteert.

Tot slot...

- Gebruik de injecties altijd volgens voorschrift van uw specialist, ook wanneer deze afwijken van de beschrijving in deze folder.
- Lees altijd de bijsluiter.
- Bij onduidelijkheden of problemen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Kliniek Boven (telefoon 020 – 755 7093). Vraagt u dan naar een verpleegkundige.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl