

Slokdarm- en/of maagonderzoek

Inleiding

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie en heeft tot doel het zichtbaar maken van de slokdarm en/of de maag. Dit gebeurt door middel van een contrastvloeistof (bariumpap).

Vorbereiding

Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat de maag helemaal leeg is. Dit houdt in dat u na 12 uur 's nachts niet meer mag eten, drinken of roken. Eventuele medicijnen kunt u innemen met een klein beetje water.

Onderzoek

Door het drinken van bariumpap worden de slokdarm en maag zichtbaar gemaakt op het doorlichtscherm.

De radioloog vraagt u verschillende keren een slok bariumpap in de mond te nemen en deze door te slikken, terwijl op een doorlichtscherm te zien is hoe de bariumpap door de slokdarm gaat.

De radioloog vraagt u in verschillende richtingen te draaien om de slokdarm en maag van alle kanten te kunnen bekijken en foto's te maken. Dit gebeurt, zo mogelijk, zowel in liggende als in staande houding.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken, waarbij het belangrijk is dat u de eerste dagen wat meer drinkt dan normaal. De ontlasting kan enige tijd

wat lichter van kleur zijn door de bariumpap.

Belangrijk

Indien u zwanger bent of denkt dit te kunnen zijn, meldt u dit dan voor het onderzoek bij uw arts, de verpleegkundige of de laborant.

De uitslag

De behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd, informeert u over de uitslag.

Opmerkingen over deze folder

Ontbreekt er informatie in deze folder of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag. U kunt uw opmerkingen doorgeven via voorlichting@zha.nl